

CITRAMOX[®] 500

Proszek do podania w wodzie do picia dla kur, indyków, kaczek i świń
Amoksycylina trójwodna 500 mg/g (co odpowiada 436 mg/g amoksycyliny)

WSPARCIE W WALCE Z INFEKCJAMI BAKTERYJNYMI



Opakowanie
1 kg



Szerokie spektrum działania przeciwko bakteriom G+ i G-.



Sprawdzone rozwiązanie przy leczeniu pasterelozy u świń.



Długi okres ważności – 3 miesiące po otwarciu opakowania.



Szeroka rejestracja – przeznaczony dla świń, kur, kaczek i indyków.



Krótką karencją na tkanki jadalne.



CITRAMOX[®] 500

Amoksyacylina trójwodna

Gatunek docelowy	Wskazania	Dawkowanie	Okres karencji na tkanki jadalne
	Leczenie infekcji wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksyacylinę.	30 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni	1 dzień
		30-40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni	5 dni
		40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 3 dni	9 dni
	Leczenie infekcji wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksyacylinę. Leczenie pasterelozy.	40 mg produktu/kg m.c./dzień przez 5 dni	2 dni



Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Citramox 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia dla kur, indyków, kaczek i świń. **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:** Każdy gram produktu zawiera: substancja czynna: Amoksyacylina 436 mg (w postaci 500 mg amoksyacyliny trójwodnej); substancje pomocnicze: Kwas cytrynowy bezwodny. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Proszek do podania w wodzie do picia. Białe proszki. Klarowny i bezbarwny płyn po rozpuszczeniu. **WSKAZANIA:** U kur, indyków, kaczek i świń: leczenie infekcji wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksyacylinę. **Świnie:** leczenie pasterelozy. **DAWKOWANIE I DROGI PODAWANIA:** Do podania doustnego. Należy przygotować roztwór ze świeżą wodą do picia bezpośrednio przed podaniem. Woda zawierająca produkt leczniczy, która nie zostanie zużyta w ciągu 12 godzin od przygotowania powinna zostać usunięta i zastąpiona świeżą. W celu zapewnienia odpowiedniego spożycia wody, żadne inne źródła wody do picia nie powinny być dostępne w okresie leczenia. Następujący wzór może być zastosowany do wyliczenia wymaganego stężenia produktu (w miligramach produktu na litr wody do picia): $[(x \text{ mg produktu na kg masy ciała na dzień} \times \text{Średnia masa ciała (kg) zwierząt leczonych}) / \text{Średnie spożycie wody (l) na zwierzę}] = x \text{ mg produktu na litr wody do picia}$. W celu zapewnienia właściwej dawki należy określić masę ciała leczonych zwierząt najdokładniej jak to możliwe. Dzieląc spożycie wody może się różnić w zależności od stanu klinicznego zwierząt. W celu przygotowania wody leczniczej zawierającej właściwą dawkę amoksyacyliny należy wziąć pod uwagę faktyczne dzienne spożycie wody. Obliczoną dawkę należy odmierzyć skalibrowaną wagą. **Kury:** Zalecana dawka wynosi 15 mg amoksyacyliny trójwodnej na kg masy ciała na dzień (co odpowiada 30 mg produktu/kg masy ciała/dzień) do podawania przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni. **Kaczki:** Zalecana dawka wynosi 20 mg amoksyacyliny trójwodnej na kg masy ciała na dzień (co odpowiada 40 mg produktu/kg masy ciała/dzień) do podawania przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni. **Indyki:** Zalecana dawka wynosi 15-20 mg amoksyacyliny trójwodnej na kg masy ciała na dzień (co odpowiada 30-40 mg produktu/kg masy ciała/dzień) do podawania przez 3 dni lub w ciężkich przypadkach 5 dni. **Świnie:** Zalecana dawka wynosi 20 mg amoksyacyliny trójwodnej na kg masy ciała na dzień (co odpowiada 40 mg produktu/kg masy ciała/dzień) do podawania przez 5 dni. Po zakończeniu okresu leczenia system dostarczania wody zwierzętom należy odpowiednio oczyścić, aby uniknąć podawania subterapeutycznych ilości substancji czynnej. **OKRESY KARENCJI:** Tkanki jadalne: **Kury** – 1 dzień, **Kaczki** – 9 dni, **Indyki** – 5 dni, **Świnie** – 2 dni. Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 3 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności. **PRZECIWWSKAZANIA:** Nie stosować u królików, kawii domowych (świnek morskich), chomików, myszokoczek i innych małych ssaków roślinożernych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny i inne antybiotyki β-laktamowe lub na dowolną substancję pomocniczą. Nie stosować u zwierząt z chorobami nerek w tym w anurii i oligurii. **SPECJALNE OSTRZEŻENIA DLA KAŻDEGO Z DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT:** Brak. **SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:** **Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:** Produkt leczniczy nie jest skuteczny przeciwko organizmom produkującym β-laktamazę. **Świnie:** Spożycie produktu leczniczego przez zwierzęta może być zmienione w wyniku choroby. W przypadku zmniejszonej ilości przyjmowanej wody, zwierzęta powinny być leczone drogą pozajelitową. Produkt powinien być stosowany zgodnie z oficjalnymi, krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi stosowania antybiotyków. Stosowanie produktu powinno opierać się na identyfikacji i badaniach antybiotykowrażliwości docelowego patogenu (-ów). Jeśli to niemożliwe, terapia powinna być oparta na informacji o sytuacji epidemiologicznej i wiedzy dotyczącej wrażliwości docelowych bakterii na poziomie gospodarstwa lub na lokalnym/regionalnym poziomie. Stosowanie produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w ChPLW może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na amoksyacylinę i zmniejszenie skuteczności leczenia amoksyacyliną. **Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:** Penicyliny i cefalosporyny mogą być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości (alergii) w wyniku wstrzyknięcia, wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą. Obserwuje się krzyżowe reakcje nadwrażliwości między penicylinami i cefalosporynami. Reakcje alergiczne na te substancje w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg. Osoby o znanej nadwrażliwości na amoksyacylinę lub które miały zalecenie nie pracować z tą substancją czynną, powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Aby uniknąć narażenia podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy postępować ze szczególną ostrożnością i brać pod uwagę wszystkie zalecenia. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów po kontakcie z produktem takich jak wysypka na skórę, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg, oczu jak również trudności w oddychaniu są najpoważniejszymi objawami wymagającymi natychmiastowej interwencji medycznej. Unikać wdychania pyłu. Nosić albo jednorazową półmaskę oddychową zgodną z europejską normą EN149 lub stosować respirator wielokrotnego użytku zgodny normą europejską EN140 z filtrem EN143. Podczas przygotowywania i podawania wody lub płynnej paszy, należy nosić rękawice. Po stosowaniu produktu, wody zawierającej produkt leczniczy lub paszy, należy umyć narażoną skórę. Po użyciu umyć ręce. **DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE (CZĘSTOTLIWOŚĆ I STOPIEŃ NASILENIA):** Penicyliny i cefalosporyny mogą być przyczyną wystąpienia reakcji nadwrażliwości (alergii), które w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane); często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt); niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt); rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt); bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty). **Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** 2407/15. **NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO:** Laboratorios Karizoo S.A., Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona, Hiszpania. **LOKALNY PRZEDSTAWICIEL PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO:** Vet-Agro TRADING Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 18, 20-234 Lublin. ChPL: 18.12.2019 r.



Vet-Agro Trading sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 18,
20-234 Lublin

**ZOSTAŃMY
W KONTAKCIE!**

