



FIPReX®

przeciwko pchłom i kleszczom



Aplikuj wygodnie co 4 tygodnie!

Prawidłowa aplikacja



KOT



PIES DO 20 KG



PIES POWYŻEJ 20 KG

Sposób podania



Odłam końcówkę tubki.



Rozchyl sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi pod łopatkami, aż skóra będzie widoczna.



Umieść końcówkę tubki na skórze i ściśnij tubkę, aby całkowicie opróżnić jej zawartość bezpośrednio na skórze.



PAMIĘTAJ!

Nie kąpij psa lub kota 2 dni przed i 2 dni po podaniu produktu.

Jakie choroby przenoszą kleszcze?

Kleszcze mogą przenosić szereg niebezpiecznych dla zwierząt chorób. Są to babeszjoza, borelioza, anaplazmoza, erlichioza i odkleszczowe zapalenie mózgu.

Dodatkowo w miejscu przyczepienia się kleszczy często dochodzi do zakażenia bakteryjnego rozprzestrzeniającego się na pozostałe partie skóry – ropnego zapalenia skóry.

FIPReX®

**POLSKI LEK
PRZECIWKO PCHŁOM I KLESZCZOM
dla psów i kotów**

Jak działa Fiprex?

Zawarta w preparacie substancja czynna – fipronil, gromadzi się w gruczołach łojowych skóry i mieszkach włosowych zwierzęcia, skąd uwalnia się na powierzchnię skóry wraz z fizjologicznie wydzielanym łojem.

Fipronil skutecznie działa na układ nerwowy kleszczy i pcheł powodując ich paraliż, a w konsekwencji obumarcie.

Po zabiciu kleszcze zazwyczaj spadają z sierści psa, a te które pozostaną mogą być usunięte przez delikatne strzepnięcie.



KLESZCZE

to pasożyty żywiące się krwią.
W trakcie bytowania na żywicielu
wprowadzają do rany znaczne ilości śliny,
w której mogą znajdować się
chorobotwórcze patogeny.

Gdzie można spotkać kleszcza?

Kleszcze mogą występować na skraju lasu, na łąkach,
w trawie, w parkach, na drzewach i krzewach, a także
w przydomowych ogródkach.

Jak atakuje kleszcz? Podstępnie!

Wgryzający się w skórę psa lub kota kleszcz
zwykle nie powoduje dyskomfortu. Jego ślina
zawiera substancje znieczulające, dlatego atak
jest nieodczuwalny.

**Kleszcze są aktywne przez cały rok, gdy
temperatura wynosi przynajmniej kilka stopni
powyżej 0.**

Kleszcz może wyczuć ofiarę nawet z 30 metrów!

Na jego odnóżach znajdują się specjalne narządy zmysłu
– tzw. organy Hallera, wrażliwe na stężenie dwutlenku
węgla oraz minimalne zmiany temperatury. W ten
sposób kleszcz dowiadyuje się, że ofiara się zbliża.



PCHŁY

to bezskrzydłe owady żywiące się krwią.
W ciągu doby pochłaniają nawet
20 razy więcej krwi niż same ważą.

Dlaczego pchły są niebezpieczne?

Pchły mogą przenosić szereg chorób zakaźnych oraz
jaja tasiemców, co stwarza zagrożenie nie tylko dla
zwierzęcia, ale także dla ludzi.

Jak pchła działa na zwierzę?

Ugryzienie pchły powoduje swędzenie,
a w konsekwencji częste drapanie i gryzie-
nie podrażnionych miejsc. Powoduje to
niepokój zwierzęcia i uszkodzenie skóry,
grożące zakażeniem. Dodatkowo ślina
pchły ma działanie silnie uczulające, co
grozi rozwojem alergicznego pchlego
zapalenia skóry.

Pchły rozmnażają się bardzo szybko!

Jedna pchła w trakcie swojego życia może złożyć do
2000 jaj, które spadają ze zwierzęcia do otoczenia.
Dlatego w zwalczaniu pcheł bardzo ważne jest nie
tylko zabezpieczenie zwierzęcia, ale także dokładne
sprzątanie całego domu.



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex KOT,
52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:**
Jedna tubka 0,7 ml zawiera: substancja czynna: Fipronil 52,5 mg. **POSTAĆ
FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania, roztwór o barwie od jasnożółtej
do jasnobrązowej. **WSKAZANIA:** Zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.),
kleszczy (*Ixodes* spp.) i wszy (*Linognathus* spp.) u kotów. Działanie zabezpieczające
przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez
okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry
(APZS), po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii. ChPL: 16.02.2016 r.



**NAZWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
WETERYNARYJNYCH:** Fiprex S,
75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla
psów; Fiprex M, 150 mg/2 ml, roztwór
do nakrapiania dla psów; Fiprex L,
300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania

dla psów; Fiprex XL, 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Fiprex S –
Fipronil 75 mg/1 ml; Fiprex M – Fipronil 150 mg/2 ml; Fiprex L – Fipronil 300 mg/4 ml, Fiprex XL – Fipronil
412,5 mg/5,5 ml. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór do nakrapiania. Roztwór o barwie od jasnożółtej
do jasnobrązowej. **WSKAZANIA:** Zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides* spp.), kleszczy (*Ixodes* spp.)
i wszy (*Linognathus* spp.) u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się
przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex można stosować jako
leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). ChPL: 25.04.2016 r.



NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Fiprex Spray, 0,5 g
/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów. **SUBSTANCJA CZYNNNA:** Fipronil
0,5 g/100 ml. **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Roztwór na skórę, roztwór o barwie
od jasnożółtej do jasnobrązowej. **WSKAZANIA:** Zwalczanie inwazji pcheł
(*Ctenocephalides* spp.), kleszczy (*Ixodes* spp.) i wszy (*Linognathus* spp.) u psów
i kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się
przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni.
Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego
zapalenia skóry (APZS), po uprzednim postawieniu diagnozy przez lekarza
weterynarii. ChPL: 25.01.2016 r.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: P.W. Vet-Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin.

F.U.01.2023.184